



گزاره برگ استفاده از خدمات سلامت در صورت ابتلا به کووید-۱۹

سیمای استان ۱۴۰۰

گزاره برگ حاضر به تبیین بخشی از نتایج پیمایش عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در سال ۱۴۰۰ می پردازد. این پیمایش با عنوان استپس نیز شناخته می شود. در واقع نام این مطالعه اشاره به سه گام اصلی آن دارد. این گامها شامل تکمیل پرسشنامه، انجام آنتروپومتری و انجام سنجشهای بیوشیمیایی است. آخرین دوره این مطالعه با همت موسسه ملی تحقیقات سلامت و توسط مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم و با مشارکت معاونت بهداشت وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۰ اجرا شد.

در این مطالعه، ۲۷۸۷۴ نفر از جمعیت گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر مورد بررسی قرار گرفت.

این بخش از این پیمایش با هدف سنجش رفتار افراد در خصوص استفاده از خدمات سلامت در دوران کووید-۱۹ انجام شده است. داده های این بخش از طریق مصاحبه حضوری با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است.

در ادامه گزیده ای از نتایج این بخش از مطالعه که حاوی اطلاعات استان آذربایجان شرقی و مقایسه آن با نتایج کشوری است ارائه می گردد.





۹۲۶ نفر از جمعیت ۱۸ سال و بالاتر در استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفتند. توزیع جمعیت مورد مطالعه به تفکیک جنس و محل سکونت در جدول ۱ ارائه داده شده است.

جدول ۱: تعداد شرکت کنندگان به تفکیک جنس و محل سکونت در استان آذربایجان شرقی و کشور

روستایی	شهری	زن	مردان	کل	
۲۵۰	۶۷۶	۴۹۴	۴۳۲	۹۲۶	استان آذربایجان شرقی
۷۵۹۸	۲۰۲۷۶	۱۵۳۹۵	۱۲۴۷۹	۲۷۸۷۴	کشور

جدول ۲: درصد استفاده از خدمات سرپایی در صورت ابتلا به کووید-۱۹ به تفکیک جنس و محل سکونت در استان آذربایجان شرقی و کشور

روستایی	شهری	زن	مردان	کل	
۷۴/۹	۶۱/۴	۵۶/۶	۷۰/۷	۶۲/۷	استان آذربایجان شرقی
۷۱/۸	۷۳/۱	۷۳/۹	۷۲/۵	۷۲/۹	کشور

درصد استفاده از خدمات سرپایی سلامت در صورت ابتلا به کووید-۱۹ در استان هم در مردان و هم در زنان کمتر از میانگین کشوری بوده است.




جدول ۳: درصد استفاده از خدمات بستری در صورت ابتلا به کووید-۱۹ به تفکیک جنس و محل سکونت در استان آذربایجان شرقی و کشور

روستایی	شهری	زن	مردان	کل	
۱۲/۶	۱۲/۶	۱۳/۴	۱۱/۶	۱۲/۶	استان آذربایجان شرقی
۱۲/۸	۱۱/۳	۱۰/۸	۱۲/۶	۱۱/۵	کشور

جدول ۴: درصد بستری در ICU به شرط بستری شدن در بیمارستان در کسانی که به کووید-۱۹ مبتلا شدند به تفکیک جنس و محل سکونت در استان آذربایجان شرقی و کشور

روستایی	شهری	زن	مردان	کل	
۰/۰	۱۱/۲۵	۰/۰	۲۵/۲	۱۰/۱	استان آذربایجان شرقی
۵/۴	۱۷/۱	۱۷/۱	۱۳/۰	۱۵/۳	کشور

درصد استفاده از خدمات بستری در صورت ابتلا به کووید-۱۹ در استان بیش از میانگین کشوری بوده در حالیکه بستری در ICU به شرط بستری در بیمارستان در مبتلایان به کووید-۱۹ در مقایسه با میانگین کشوری کمتر بوده است. این رقم در بین زنان بستری در بیمارستان برابر یا صفر می باشد.



نمودار ۱: میانگین سن به تفکیک جنس در استان آذربایجان شرقی و کشور

جدول ۵: درصد بهبودی کامل پس از ابتلا به کووید-۱۹ به تفکیک جنس و محل سکونت در استان آذربایجان شرقی و کشور

روستایی	شهری	زنان	مردان	کل	
۱۰۰/۰	۹۴/۴	۹۳/۳	۹۷/۱	۹۴/۹	استان آذربایجان شرقی
۹۴/۷	۹۴/۳	۹۴/۱	۹۴/۹	۹۴/۴	کشور

درصد بهبودی کامل پس از ابتلا به کووید-۱۹ به تفکیک جنس در استان آذربایجان شرقی و کشور تقریباً مشابه بوده است. اما در ساکنین روستا در آذربایجان شرقی بیش از میانگین کشوری بوده می باشد.



جدول ۶: درصد دریافت مراقبت کووید-۱۹ از شماره ۰۳۰ یا بستر آنلاین به تفکیک جنس و محل سکونت در استان آذربایجان شرقی و کشور

روستایی	شهری	زنان	مردان	کل	
۴۶/۸	۲۸/۷	۳۵/۵	۳۲/۱	۳۳/۹	استان آذربایجان شرقی
۳۶/۲	۳۷/۸	۳۷/۹	۳۶/۹	۳۷/۵	کشور

جدول ۷: درصد دریافت تماس از سیستم بهداشتی درمانی جهت بررسی وضعیت سلامتی در دوران کووید-۱۹ به تفکیک جنس و محل سکونت در استان آذربایجان شرقی و کشور

روستایی	شهری	زنان	مردان	کل	
۸۲/۵	۶۲/۹	۷۱/۶	۶۵/۱	۶۸/۵	استان آذربایجان شرقی
۵۷/۷	۵۴/۴	۵۹/۳	۵۵/۷	۵۷/۷	کشور

نتیجه گیری:

نتایج این مطالعه نشان داد بهره مندی از خدمات سلامت در صورت ابتلا به کووید-۱۹ در استان آذربایجان شرقی در مقایسه با میانگین کشوری کمتر است. در مجموع، نابرابری‌هایی که در دوران همه گیری کووید-۱۹ شاهد آن بوده ایم با عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامتی و در نهایت نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت در ارتباط است لذا اتخاذ سیاستها و اقداماتی جهت از بین بردن عواملی که به نابرابری‌های سلامتی و اقتصادی دامن می زنند، ضروری است.

